

الفئران في المنشآت الغذائية



في حالة الفشل في الحفاظ على منشآتك خالية من الآفات قد يؤدي ذلك أيضاً إلى إصدار الأوامر، أو قسائم المخالفات أو إجراءات قانونية أخرى.

يمكن للفئران أن تلوث الامدادات الغذائية من خلال بولها وبرازها أو بسطوح أجسامها. تلتقط الفئران الجراثيم، مثل السالمونيلا، عندما ترحف أو تأكل الأطعمة الفاسدة أو النفايات. حيث إن الفئران تنتقل في كافة أنحاء المطبخ وتقوم بقضم الطعام وتبول وتترك الفضلات، تنتقل الجراثيم إلى الطعام وحاويات الطعام والرفوف والأواني، وإلخ. تقدم هذه النشرة معلومات أساسية عن الفئران والسيطرة عليها داخل المنشآت الغذائية. منع انتشار الفئران في منشآتك أمر بالغ الأهمية. إذا أصبح تفشي الفئران مشكلة كبيرة بحيث لا يتم فيها ضمان سلامة الأطعمة و/أو لا يمكن فيها حماية الأواني وأسطح الطعام من التلوث، قد تكون منشآتك معرضة للغلق.

السيطرة على الفئران

- تتطلب السيطرة على الفئران في المنشآت الغذائية مجموعة من الإجراءات. ندرج في أدناه بعض التدابير الفعالة للسيطرة على الفئران:
 - سد الثقوب أو الفتحات التي قد تدخل الفئران من خلالها. قم بسد الفراغ الموجود حول الأنابيب، فتحات التهوية، وفوهات صرف المياه والتي يمكن أن تدخل من خلالها إلى البناية. يجب أن يتم سد جميع الفتحات التي يكون حجمها أكبر من 6 ملم (1/4 بوصة).
 - قم بتفتيش جميع إرساليات الأغذية المستلمة للبحث عن علامات إصابتها أو تلوثها ببول الفئران أو فضلاتها. يجب أن يتم إعادة جميع إرساليات الأغذية الملوثة أو الموبوءة إلى المورد.
 - قم بتخزين جميع الأطعمة على ارتفاع لا يقل عن 6 بوصات عن الأرضية وليكن مستوى الأرضية مفتوحاً.
- إذا أصبح تفشي الفئران مشكلة كبيرة بحيث لا يتم فيها ضمان سلامة الأطعمة و/أو لا يمكن فيها حماية الأواني وأسطح الطعام من التلوث، قد تكون منشآتك معرضة للغلق.

من المهم أن يتم السيطرة على الفرن بمجرد العثور على العلامات الأولى.

ستساعد السيطرة المبكرة على مجاميع الفرن على منع احتمال حدوث انتشار واسع والذي سيكون القضاء عليه صعباً ومكلفاً. من المهم أن تقوم شركة معتمدة لمكافحة الآفات بالاضطلاع بخدمات سيطرة ومراقبة فعالة. بالإضافة إلى خدمات السيطرة على الآفات، سيؤدي استخدام مزيج من النظافة الجيدة، تعديل البيئة والحواجز المادية داخل منشأتك إلى ضمان الوقاية من انتشار الفرن والسيطرة عليها.

إذا كانت لديك أية أسئلة عن انتشار الآفات، يرجى الاتصال بالموظف المحلي للصحة البيئية.

مكتبك المحلي للصحة البيئية على بعد مكالمة هاتفية فقط:

- أبوتسفورد 870-7900 (604)
- أغاسيس 793-7160 (604)
- برنابي 918-7683 (604)
- تشيليوك 702-4950 (604)
- دلتا 507-5478 (604)
- هوب 867-7630 (604)
- لانغلي 514-6121 (604)
- ميشن 814-5515 (604)
- نيو ويستمنستر 777-6740 (604)
- ريج ميدوز 476-7000 (604)
- سيرري 930-5405 (604)
- تراسي سنيز 949-7700 (604)

لمزيد من المعلومات، أو إذا كانت لديك أية أسئلة، اتصل بالمكتب المحلي لخدمات الصحة البيئية.

الموقع الإلكتروني:

www.fraserhealth.ca/your_environment/

متوسط عمر الفرن

يمكن لمشكلة صغيرة أن تتحول بسرعة إلى مشكلة كبيرة إذا لم يتم معالجتها. يمكن أن تتكاثر أنثى الفرن ما يصل إلى ثماني مرات في السنة مع ولادة خمسة إلى ستة فئران في كل حمل. وبعد مرور ثلاثة أشهر على ولادتها، تكون الفئران قادرة على التكاثر.

أين تعيش الفئران

تبنى الفئران أعشاشها في أماكن مظلمة ودافئة وهادئة وقرب الأطعمة. تعتبر المساحات في الجدران المزدوجة والأماكن المغلقة تحت الطاولات وفي أماكن التخزين مواقع تعيش مثالية.

تميل الفئران أن تكون فعالة جداً في الليل عندما يسود الظلام ولا يوجد أحد هناك. غالباً ما يشير مشاهدة الفئران أثناء النهار إلى حدوث انتشار واسع النطاق.

يمكن أن تتكيف الفئران مع الأوساط المسببة للإجهاد. يمكن أن تبيت الفئران في سبات لتوفير الطاقة خلال الظروف الحارة أو الباردة جداً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعيش الفئران بدون ماء. تحتاج الفئران فقط إلى مليلتر واحد أو مليلترين من الماء يومياً، والذي يمكنهم الحصول عليه من أطعمة مثل الحبوب.

مصادر الانتشار

يمكن أن يحدث تفشي الفئران عند دخولها من المؤسسات المجاورة عبر فتحات في الجدران والسقوف. تعتبر عمليات التسليم مصدراً رئيسياً للتفشي.

حماية الطعام

بادر بخزن إمدادات المواد الغذائية الجافة في حاويات معدنية أو زجاجية أو بلاستيكية مع غطاء محكم، كلما كان ذلك ممكناً.

بادر بتنظيف وتعقيم الأسطح التي تلامس الأغذية في بداية كل يوم لإزالة فضلات وبول القوارض التي ربما تم تركها في الليلة السابقة.

قم بتفتيش المنشآت بانتظام لعلامات التفشي مثل الفضلات أو المواد الغذائية التالفة.