

Los Ratones en Establecimientos de Comida

Los ratones pueden contaminar las provisiones alimenticias con su orina, heces o con la superficie de sus cuerpos. Los ratones atraen microbios, como la salmonela, cuando se arrastran por encima de comidas y desperdicios en descomposición, o los ingieren. En sus viajes alrededor de la cocina, los ratones orinan y dejan excrementos, y los microbios se traspasan a la comida, las encimeras o mostradores, anaqueles, utensilios, etc.

Este boletín ofrece información básica acerca de los ratones y formas de controlarlos dentro de su establecimiento alimentario. Es crítico **prevenir** las infestaciones en su establecimiento.

En el caso de que una infestación evolucione a un punto tan grave que la seguridad de los alimentos no puede estar garantizada y/o los utensilios y las superficies de preparación de comidas no pueden estar protegidas de la contaminación, su establecimiento puede estar sujeto a clausura oficial.



La falta de mantenimiento libre de plagas de sus locales podría también resultar en la emisión de órdenes, citaciones por incumplimiento, u otras acciones legales.

Control de Ratones

El control de ratones en un establecimiento de comida requiere una combinación de acciones. Las siguientes son algunas medidas efectivas para el control de ratones:

- Sellar cualquier agujero u apertura donde los ratones podrían ingresar. Llene los espacios alrededor de las tuberías, respiraderos, y los desagües en donde entran al edificio. Debe sellar todos los agujeros de más de seis milímetros (1/4 de pulgada).
 - Inspeccionar todas las entregas buscando señales de infestación o de contaminación con orina o heces de ratones. Toda entrega infestada o contaminada debería ser devuelta al proveedor.
 - Almacenar todos los alimentos a no menos de 6 pulgadas (15 cm) del piso y mantener el nivel del piso abierto.
- Rotar sus existencias regularmente para prevenir que hayan áreas que permanezcan sin perturbaciones por largos periodos de tiempo.
 - Mantener un alto nivel de sanidad en todo el establecimiento. Retire todas las fuentes alimenticias al final de cada día (incluyendo migas, derrames, residuos de comida, etc.)
 - Emplear una compañía certificada de control de plagas para obtener servicios de erradicación y monitoreo. Asegúrese de que las recomendaciones de dicha compañía sean implementadas.

En el caso de que una infestación evolucione a un punto tan grave que la seguridad de los alimentos no puede estar garantizada y/o los utensilios y las superficies de preparación de comidas no pueden estar protegidas de la contaminación, su establecimiento puede estar sujeto a clausura oficial.

Ciclo de Vida de los Ratones

Un problema pequeño puede rápidamente convertirse en un problema grande si no es abordado. Las ratonas pueden producir hasta ocho camadas cada año con cinco a seis crías en cada camada. A los tres meses de haber nacido, los ratones se pueden reproducir.

Dónde Viven los Ratones

Los ratones forman nidos en áreas oscuras, cálidas y tranquilas y en cercanía de alimentos. Los espacios en paredes dobles y en áreas cerradas debajo de las encimeras y en áreas de almacenamiento son ideales como nidos.

Los ratones tienden a estar más activos de noche cuando está oscuro y no hay gente en el local. El hecho de ver ratones durante el día puede indicar una infestación extensa.

Los ratones se adaptan a los entornos estresantes. Pueden pasar a un estado de latencia para ahorrar energía durante condiciones de extremo calor o frío. Además, los ratones pueden sobrevivir sin agua; solo requieren uno o dos mililitros de agua cada día, que pueden obtener de alimentos como los cereales.

Fuentes de Infestación

Las infestaciones pueden resultar cuando los ratones ingresan de establecimientos vecinos a través de aperturas en las paredes y los techos. Las entregas de provisiones son una fuente principal de infestaciones.

Protección de los Alimentos

Almacene las provisiones de alimentos secos en contenedores de metal, vidrio o plástico con tapas herméticas siempre que sea posible.

Limpie y desinfecte todas las superficies que contacten con los alimentos al inicio de cada día para eliminar las heces y orina de roedores que podrían haber sido depositados la noche anterior.

Inspeccione el local regularmente buscando señales de infestación como heces o daños en los alimentos.

Es crítico controlar a los ratones tan pronto como el primer signo sea detectado.

El control temprano de las poblaciones de ratones prevendrá la posibilidad de infestaciones grandes que son difíciles y costosas para erradicar. Es importante contratar a una compañía certificada de control de plagas para implementar servicios efectivos de control y monitoreo. Además de servicios de control de plagas, el uso de una combinación de buena sanidad, modificaciones ambientales y barreras físicas en sus locales ayudará a asegurar que las infestaciones de ratones sean prevenidas y controladas.

Si tiene preguntas acerca de una infestación, contacte a su Oficial de Salud Ambiental.

Puede fácilmente contactar a la Oficina de Salud Ambiental de su localidad por teléfono:

- Abbotsford (604) 870-7900
- Agassiz (604) 793-7160
- Burnaby (604) 918-7683
- Chilliwack (604) 702-4950
- Delta (604) 507-5478
- Hope (604) 867-7630
- Langley (604) 514-6121
- Mission (604) 814-5515
- New Westminster (604) 777-6740
- Ridge Meadows (604) 476-7000
- Surrey (604) 930-5405
- Tri-Cities (604) 949-7700

Para más información, o si tiene preguntas, contacte a la Oficina de Servicios de Salud Ambiental de su localidad.

Sitio web: www.fraserhealth.ca/your_environment/